



THRIPEX-V™

Neoseiulus cucumeris (Amblyseius cucumeris)

www.koppert.ca

Produit

Conditionnement: bouteille de 1.000 ml
Contenu des bouteilles: 50.000 prédateurs dans de la vermiculite avec une fraction de son.

Précautions

Lors de la dispersion du produit, son inhalation peut entraîner des réactions allergiques. Veiller à ce que l'utilisateur et les personnes au voisinage portent un masque de protection des voies respiratoires.

Cible

Diverses espèces de thrips. Œufs éclosant et larves de 1er stade. [Cycle de vie du thrips](#). Ces prédateurs consomment aussi diverses espèces d'acariens (par ex. le Tarsonème du fraisier et des serres), du nectar et du pollen.

Niveau d'apport

Les indications ci-dessous sont uniquement fournies à titre indicatif. Des conseils sur mesure peuvent être fournis une fois que les facteurs locaux – culture, conditions climatiques et degré d'infestation – sont connus. Pour des conseils adaptés à votre situation, contactez un technicien Koppert.

Quelle dose utiliser ?

	Dose	1 unité pour (m ²)	Intervalle (jours)	Fréquence	Remarques
Préventif	50/m ²	500 - 1.000	14	-	-
Attaque légère	100/m ²	250 - 500	14	-	-
Renforcement du programme	100/m ²	250 - 500	7	-	-

Introduction

Tourner et agiter la bouteille avec précaution avant emploi
Répandre le matériel à la main sur les feuilles, il est possible de répartir mécaniquement sur la culture à l'aide du diffuseur d'acariens [MINI-AIRBUG](#)

Conditions

L'humidité ne doit pas être trop basse ($\pm 75\%$) et la température doit régulièrement dépasser 20°C. THRIPEX-V contient une souche de *Neoseiulus cucumeris* qui n'est pas soumise à la diapause. En conséquence, ce prédateur peut être utilisé également en hiver.

Stockage

Les prédateurs biologiques ont une durée de vie (extrêmement) courte et doivent donc être introduits dans une culture le plus rapidement possible après leur réception. Dans la mesure où un stockage peut avoir une influence négative sur la qualité, celui-ci ne peut être effectué que dans les conditions décrites ci-dessous. Koppert B.V. n'est pas responsable de toute perte de qualité due à un stockage prolongé du produit et/ou dans de mauvaises conditions.

Après réception: 1-2 jours

Température de stockage: 8-10°C

À l'obscurité (bouteille à l'horizontale)

Remarques

THRIPEX-V (THRIPEX Vermiculite) comporte une petite fraction de son et une faible quantité d'acariens de la farine. Le risque de dommages (tâches, pourriture du feuillage) est par conséquent plus faible.

Description

Stade mobile: beige-rosé, forme ronde et ramassée sur pattes courtes, se tient souvent dissimulé le long des nervures et dans les fleurs

Œufs: transparents blancs, fixés sur la pilosité le long des nervures sur la face inférieure des feuilles

Mode d'action

Les adultes et les nymphes de cet acarien prédateur cherchent leurs proies (mais pas toujours activement), ils attendent une nouvelle proie éventuelle et la vident de son contenu.

[Vidéo mode d'action](#)

Effets secondaires

[THRIPEX-V](#)